

眞子さま&小室さん“駆け落ち婚”/甲子園Heroes&全記録

# 週刊朝日

創刊99周年



永田町に大激震  
“音退場”的  
全内幕

9月オススメ

主催30銘柄

9・17

増大号

470円

井上芳雄、堂本光一

週刊朝日

9月17日増大号 第126巻第46号通巻5733号 第33種郵便物認可  
2021年9月17日発行 補聴器専門店 (9月7日発行)

発行人 尾木和晴  
編集長 渡部 翼

発行所 朝日新聞出版

〒101-3011東京都中央区銀座5-3-2  
電話(03)5541-8787(編集) (03)5540-7788(販売)

特別定価470円  
本体427円(税込)

オーティコン補聴器

〒212-0013神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館16階 電話:044-543-0615(代) フックス:044-543-0616

[www.oticon.co.jp](http://www.oticon.co.jp)

oticon  
life-changing technology

世界初\*、DNN搭載

DNN (ディープニューラルネットワーク)とは  
日常にある1200万通りの音の情景を学習することで、  
音をより正確に、より鮮明に、脳へ届ける先進の機能です。

\*世界初(DNNを搭載した補聴器)は2020年11月末時点です。調査元(自社調べ)

世界でMoreが数々の賞を受賞しました

無料 8月21日から4週連続オンラインセミナー開催中  
(オンデマンド視聴 2021年10月31日(日)まで)

オーティコン  
国際シンポジウム 2021

Oticon International Symposium 2021

「難聴と認知症、聴覚ケアの最前線」

視聴申込は右のQRコードから専用申込フォームにアクセスいただき  
必要事項をご入力ください。



# 痔

(3) きれ痔

## 名医が教える 日本人の病気の最新治療

### 排便時に強くいきむと発症 便秘の改善や患部の温めが効果的

便秘がちで、排便の際に強くいきむことが多いと起こりやすくなるきれ痔。赤ちゃんから高齢者まで、広く発生することから、毎日、おしりの負担にならない排便習慣を続けることが、悪化防止・再発防止の要になる。

3人に1人は痔があるといわれるほど、痔に悩む人は多い。痔にはいぼ痔（痔核）、あな痔（痔ろう）、きれ痔（裂肛）と、病態によって主に三つの種類がある。最も患者数が多いのはいぼ痔だが、裂肛は、受診するほどではない程度のものなら、だれもが生涯に一度は経験するといわれるくらい、身近な病気だ。

腫瘍は肛門の内側にあ

る上皮が切れたり裂けた

りした状態になる。肛門

原因として、排便の際のいきみや、硬い便、太い便など、肛門に強い力が加わることが考えられる。また、繰り返す下痢便も誘因となる。乳幼児から高齢者まで、世代を問わず発症する。20～40代の女性に多く発症するのは、便秘になりやすいことがその理由の一つとして考へられている。


年に1、2度起こる程度なら、多くは心配はない。しかし、裂肛の傷が治らないうちにまた裂けるなどを何度も繰り返していると、慢性化してしまい、傷が潰瘍化したり痛みが続くようになる。

また、患部は徐々に硬くなり（線維化）、傷も大きくなる（線維化）。肛門上皮だけでなく、その部分がいぼ状になつたものだ。直腸側に「肛門ポリープ」としてできることもある。排便時にこのいぼに気づいて、いぼ痔ができたといつて受

診する人も多いという。裂肛の治療は、保存療法（排便習慣の改善と薬物療法）と、手術がある。手術は肛門狭窄が起きている重症例になり、狭窄が強いため、痛みが強く、痛みがないといふ。また、潰瘍や見張りいぼなどの強い痛みが続く場合にも手術が考慮される。術式として、切開はおこなわず手指を用いて肛門を広げる術式、硬くなつた部分を切除する術式、硬くなつた内括約筋を切開する術式、広範囲に切

■きれ痔（裂肛）の構造

イラスト 今崎和広



歯状線～肛門の間の肛門上皮に傷ができる。年齢を問わずに起り、便秘がちの赤ちゃんの便に血が付くことで母親が気づき、受診するケースもめずらしくない

除し、皮膚を移動させて肛門を形成する術式などがあるが、いずれも高度な技術が必要となる。東葛辻伸病院院長の松尾恵五医師は次のように話す。

「肛門狭窄を起こすのは、よほど重症例なので、手術が必要になるケースはそれほど多くありません。ほとんどは保存療法で、じゅうぶんな改善を見込めます」

保存療法の一つである

薬物療法では、消炎鎮痛作用をもつ軟膏や、内服薬として便秘を改善する緩下剤などが用いられる。

#### 便秘の改善で肛門の負担を軽減

もう一つの保存療法である排便習慣の改善は、治療の根幹となるといつても過言ではない。

「まず、便秘を起こさないようにする。1日に1～5リットル以上の水分をとる、

海藻類やいも類、果物などに含まれる水溶性食物繊維や、腸内環境を整える乳酸菌、発酵食品などを積極的にとるといいだろ。起床時に水を飲んで消化管の反射を促す、規則的な食事を習慣づけるなどもプラスになる。また、下痢も肛門上皮には負担になるため、アルコールや辛い物などの刺激物、冷たい飲み物などは控えめにする。

便意を我慢しない、便意が起きてからトイレに行く、トイレにいるのは3～5分以内など、排便行動も改善する。便をいきまずに出せるようにして、肛門に負担をかけないことが大切だ。

松島病院大腸肛門病センター副院長の岡本康介医師はこう話す。

「肛門周囲を清潔に保つことは大切ですが、肛門の傷口から菌に感染するのがこわいために、温水洗浄便座を過剰に使う傾



東葛辻伸病院院長  
松尾恵五医師



松島病院  
大腸肛門病センター  
副院長  
岡本康介医師

#### きれ痔 データ

裂肛および痔ろうで1年間罹患者数	万8000人（2017年厚生労働省患者調査）
かかりやすい性別	女性
かかりやすい年代	年代を問わない
主な原因	排便時のいきみなど
主な症状	出血、痛み
主な治療	保存療法（排便習慣の改善、薬物療法）、肛門狭窄併発時には手術

便意を我慢しない、便意が起きてからトイレに行く、トイレにいるのは3～5分以内など、排便行動も改善する。便をいきまずに出せるようにして、肛門に負担をかけないことが大切だ。

松島病院大腸肛門病センター副院長の岡本康介医師はこう話す。

「肛門周囲を清潔に保つことは大切ですが、肛門の傷口から菌に感染するのがこわいために、温水洗浄便座を過剰に使う傾

文