

治療法別ランキングの4585病院

いい、いい、いい、 手術数 で わかる 病院 2022

創刊
20年目!
Anniversary

週刊朝日
MOOK



本誌は収益の一部を日本のがん活動のために寄付します



特集

コロナで手術はどうなったか?

手術数が増えた病院
減った病院

2019年→2020年の
データ比較

四つのケースで
専門医が
アドバイス

病院を 変える勇気

—がん治療の選択—

がん別
ロボット手術数
ランキング



トップ病院インタビュー

天野 篤 医師

(順天堂大学順天堂医院)

渡辺俊一 医師

(国立がん研究センター中央病院)

治療法の
「チョイス」を
図解で解説!

【がん】(心臓病)
【脳の病気】
【骨・関節】(眼)
【パーキンソン病】
ほか



肛門の病気の診断と治療

寄稿



宮島 伸宜

恵仁会松島病院 院長
日本大腸肛門病学会 理事長

正しい排便習慣身につけ、ライフスタイルの改善を

一般的には痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)、痔瘻(あな痔)が肛門の三大疾患です。

痔核は直腸や肛門周辺の静脈叢が鬱血して腫れ上がった状態で、排便時の出血、いぼのようなでっばりがあります。便秘によるいきみ、排便時間の長さが原因で、正しい排便習慣を身につけ、ライフスタイルを改善する必要があります。

炎症を抑える薬や排便を促す非刺激性下剤などの薬物療法を行っても出血がお

さまらない、出っ張りが改善しない、痛みがあるなどの場合は手術治療の適応です。注射による「ALTA療法」と、原因になる血管を処理して出っ張りを切除する「結紮切除術」に大別され、状況に応じて治療方法を選びます。

肛門狭窄やポリープが大きい場合、手術が必要

裂肛は肛門上皮という直腸と肛門の皮膚の間にある部分が裂ける疾患です。便秘や硬い便、下痢などの刺激が基本的な原因。排便時の痛みが主な症状で、出血は軽度ですが、慢性化すると肛門の伸展性がなくなり、潰瘍ができたり、肛門が狭くなったり(肛門狭窄)します。慢性化する前の排便状態の改善が最大の治療方法で、肛門狭窄やポリープが大きい場合、手術が必

要です。

便中の細菌が肛門内側の凹みに入り込んで感染を起こして膿がたまると、肛門の周りをはれてズキズキした痛みや高熱がでる肛門周囲膿瘍へと進み、さらに肛門の内側と肛門の周りの皮膚がトンネルでつながった状態になります。これが痔瘻で、手術以外に治療方法はありせん。